

Små og store sår

Skrubbsår, klor, rifter osv stopper som regel å blø av seg selv og trenger vanligvis ingen annen behandling enn det andre barn får.

Større sår kan kreve mer behandling.

Blør det gjennom plaster/vanlig kompress, kan man bruke

Spongostan:

- Klipp til en passende bit og legg rett på såret.
- Fest med plaster eller bandasje.

Spongostan er en gelatinsvamp som legger seg som en falsk skorpe og er med på å begrense blødningen.



Spongostan kan kombineres med **Cyklokapron**:

- Knus en tablett, bland med et par dråper vann til en grøt som legges på Spongostanbiten og så rett på såret med plaster over.

Cyklokapron er et medikament som "forsterker" blodleveringen når man inntar det, men har også en lokal effekt i såret.



Hvis det fortsetter å blø, selv om du har prøvd med Spongostan og eventuelt Cyklokapron, kan du legge på **trykkbandasje**:

- Ikke ta av det som er lagt på, men legg en tørr kompress over
- Legg et viskelær, legokloss eller lignende oppå
- Stram bandasje rundt for å få trykk direkte på såret.



Blør det gjennom dette også, må **faktorkonsentrat** gis.

Faktorkonsentrat er konsentrert og frysetørret faktor VIII eller IX. Det må gis intravenøst av foreldrene eller på sykehuset.